

Ime preiskave	Lupus antikoagulant
Opis	<p>Lupusni antikoagulanti (LA) so avtoprotitelesa proti negativno nabitim fosfolipidom, proti kompleksom fosfolipidov z β2-glikoproteinom I ali z nekaterimi koagulacijskimi faktorji. Lupusni antikoagulanti vodijo k povečanemu tveganju za nastanek tromboemboličnih dogodkov.</p> <p>Lupusne antikoagulante najdemo najpogosteje pri avtoimunih boleznih. Odkrijemo jih z koagulacijskimi preiskavami, ki so odvisne od fosfolipidov, kot so aPTČ, ali test z razredčenim Russelovim modrasovim strupom (DRVVT). Podaljšan koagulacijski čas, ki ga ne moremo popraviti z mešanjem bolnikove in normalne plazme, običajno opozarja na lupusne antikoagulante.</p> <p>Preiskavo za lupusne antikoagulante opravimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pri podaljšanju koagulacijskih časov, ki so odvisni od fosfolipidov - povečanem nagnjenju k trombozi, - pri trombocitopenijah in spontanah splavih, - pri avtoimunskih boleznih, npr SLE ali pri drugih revmatičnih boleznih. <p>Arterijske in venske tromboze so glavna klinična značilnost antifosfolipidnega sindroma. Pogostost tromboze pri bolnikih z lupusnumi antikoagulanti je tudi do 36%.</p>
Oznaka pri naročanju	Lupus antikoagulant- LA
Vzorec	plazma (venski odvzem)
Vsebnik	Epruveta z Na- citratom
Referenčne vrednosti	neg.
Čas izvedbe	3-4 tedne (nujno 8 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	